

Die Sammlungen des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau

IX. Die Tortricini (Lepidoptera, Tortricidae) der Sammlung Dr. W. THOMAS

TIMM KARISCH

Zusammenfassung

Der Beitrag informiert über die Tortricini (Lepidoptera: Tortricidae: Tortricinae) der Sammlung Dr. WERNER THOMAS. Es werden 23 Arten mit den zugehörigen Fundortangaben aufgeführt.

Summary

The report informs about the Tortricini (Lepidoptera: Tortricidae: Tortricinae) of the collection of Dr. WERNER THOMAS. 23 species are listed with the dates and localities, where and when they were captured.

Einleitung

In Fortführung der bisher publizierten Teile des Kataloges der Tortricidae-Sammlung von Dr. WERNER THOMAS, welche 1991 vom Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau übernommen wurde (vgl. KARISCH 1999, 2003), werden hier die Angaben für den Tribus Tortricini aufgelistet. Zur Gestaltung des Kataloges und zur Lage der wichtigsten Fundorte siehe KARISCH (1999). Nomenklatur und Systematik der europäischen Arten folgen RAZOWSKI (2002).

Katalog der Tortricini

Spatalistis bifasciana (HÜBNER, [1787])

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Bindsachsen, Christinenhof, 1 ♀ 25.VI.1969, Steinau: Hoher Stein, 1 Ex. o. A. (= ohne Abdomen) 2.VII.1969; Taunus/Hessen: Langenhain, Vogeltal, 1 ♂ 3.VII.1971.

V.: Europa (wenig im mediterranen Gebiet) (KARSHOLT u. RAZOWSKI 1996).

***Tortrix viridana* LINNAEUS, 1758**

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Hoherodskopf, 1 ♀ 25.VI.1968 Hg-Lampe, Schotten, Alte Burg, 1 ♂ 15.VI.1968 Lichtfang, Laubacher Wald, Fh. Jägerhaus, 1 ♀ 24.V.1968 e. l. Quercus, 1 ♂ 25.V.1968 e. l. Quercus, Eichelsdorf, Hofplatte 1 ♀ 17.VI.1968 Lichtfang, Bindsachsen, 1 ♂ 1 ♀ 18.VI.1968; Wetterau/Hessen: Friedberg, 1 ♂ 17.VI.1967; Deisenhofen, München, 1 ♂ 6.6.1973 Licht, leg. BEHOUNEK.

V.: Europa, NW-Afrika, Kleinasien, Kaukasien, Iran (RAZOWSKI 2002).

***Aleimma loeflingianum* (LINNAEUS, 1758)**

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Flensungen, 2 ♂♂ 28.VI.1968 Lichtfang, Steinau, Hoher Stein, 1 ♂ 2.VII.1969 Lichtfang, Hoherodskopf, Künanzhaus, 1 ♀ 2.VII.1968 Hg-Lampe; Wetterau/Hessen: Friedberg, 2 ♂♂ 24.VI.1967 Lichtfang, 1 ♂ 5 ♀♀ 2.VII.1967 Lichtfang.

V.: Europa, Kleinasien, Kaukasien, Syrien (KUZNETSOV 1989, RAZOWSKI 2002).

***Acleris holmiana* (LINNAEUS, 1758)**

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Eschenrod, Im Strittges, 1 ♀ 28.VII.1967 Lichtfang, Eichelsbachtal, 1 ♂ 27.VII.1968, 1 ♂ 28.VII.1967 aus Gebüsch geklopft, Warte, 1 Ex. o. A. 1.VIII.1968 Lichtfang; Wetterau/Hessen: Ober-Mörlen, 1 ♀ 10.VI.1971 Lichtfang, Friedberg, 1 ♂ 13.VII.1967 Lichtfang, 1 ♂ 14.VII.1967 Lichtfang, 1 ♂ 15.VII.1967 Lichtfang, 1 ♀ 21.VII.1972 Lichtfang.

V.: Europa, Kleinasien (RAZOWSKI 2002), Kaukasien (KUZNETSOV 1989).

***Acleris forsskaleana* (LINNAEUS, 1758)**

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Eschenrod, Warte, 1 ♀ 1.VIII.1968 Lichtfang, Eichelsbachtal, 2 ♂♂ 27.VII.1967 aus Gebüsch geklopft, Ullrichstein, Nickel, 1 ♀ 19.VIII.1968, Köddingen, Hopfengall, 1 ♂ 29.VII.1968; Wetterau/Hessen: Friedberg, 1 ♀ 15.VII.1967 Lichtfang; Mittelrhein: Umg. Köln, Holweide, 1 ♂ 22.VII.1974.

V.: Europa, Kleinasien, Kaukasien, Bergland von Turkmenien, nach Nordamerika verschleppt (KUZNETSOV 1989, RAZOWSKI 2002).

***Acleris laterana* (FABRICIUS, 1794)**

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Flensungen, 1 ♀ (GU [= Genitaluntersuchung] Dr. THOMAS) 6.VIII.1968 Lichtfang, Hoherodskopf, Künanzhaus, 1 ♀ (GU Dr. THOMAS) 22.VIII.1967 Lichtfang, Breungeshain, Sauborn, 1 ♀ 23.VIII.1967, Chr.[?], 1 ♂ (GU Dr. THOMAS) 25.VII.[19??]. Frankreich: Manché, Sourdeval, 1 ♂ (Gen.-Präp. 1776 [KARISCH]) 12.VIII.1974.

V.: Von Europa bis China und Japan (RAZOWSKI 2002).

***Acleris sparsana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Steinau, Ulmbachtal, 1 ♀ 22.VIII.1968, Ilbeshausen, Steinkopf, 1 ♂ 1 ♀ 1 Ex. o. A. 22.VIII.1968, Laubacher Wald, F. Jägerhaus, 1 ♂ 31.V.1968, Goldwiese, 1 ♀ 28.VIII.1968, Geddern, 1 ♂ 29.VIII.1968, Hochmoor, 1 ♂ 27.VIII.1968, Busenborn, Pfingstweide, 1 ♂ 23.VIII.1967 geklopft, Burgholzhausen, 1 ♀ 25.VIII.1968, Gierbachtal, 1 ♂ 1.XI.1968, Rudingshain, Platte, 1 ♂ 29.VIII.1967, —, Birke, 1 ♂ 23.VIII.1967 geklopft, Eschenrod, Eichelsbachtal, 1 ♂ 21.VIII.1968, Breungeshain, Sauborn, 1 ♂ 29.VIII.1967, Ullrichstein, Nickel, 1 ♂ (Gen.-Präp. 1775 [KARISCH]) 1 ♀ 28.VIII.1967, Hoherodskopf, Künanzhaus, 1 ♂ 13.IX.1968 Hg-Lampe, 2 ♂♂ 1 Ex. o. A. 25.IX.1968 Hg-Lampe; Wetterau/Hessen: Friedberg, 1 ♂ 8.VIII.1967, Lichtfang.

V.: Nördliches und mittleres Europa, Kleinasien, Transkaukasien. (KUZNETSOV 1989, RAZOWSKI 2002).

***Acleris rhombana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Hoherodskopf, Künanzhaus, 1 ♂ 28.IV.1968 Lichtfang, Eschenrod, 1 ♀ 30.VIII.[19]67, Flieden, 1 ♂ 22.VIII.1968; Wetterau/Hessen: Friedberg, 1 ♂ 5.VIII.1972 Lichtfang, Ober-Mörlen, 1 ♀ 13.XII.1972 an beleuchteter Haustüre; „42“ 1 ♂.

V.: Europa bis zum Kaukasus und Turkmenien (RAZOWSKI 2002), nach KUZNETSOV (1989) auch Kleinasien, Zentralamerika.

Acleris emargana (FABRICIUS, 1775)

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Hoherodskopf, Künanzhaus, 2 ♂♂ 16.IX.1968 Hg-Lampe, 1 ♂ 28.IX.1968 Hg-Lampe, Hirzenhain, Saukopf, 1 Ex. o. A. 29.VIII.1968, Ilbeshausen, Steinkopf, 1 ♂ 22.VIII.1968.

V.: Holarktisch von Westeuropa bis Japan, Nordamerika (KUZNETSOV 1989, RAZOWSKI 2002).

Acleris lorquiniana (DUPONCHEL, 1835)

Deutschland: Süd-Baden: Kais[er]st[uhl], Faule Waag, e. l. Lythrum salicaria, 2 ♂♂ E VIII.[19]61, E. JÄCKH.
Serbien: Belgrad, 1 ♀ 10.VII.19[?] L[ichtfang].

Rumänien: Bukarest, „Vogelwald“, 1 ♀ 5.VIII.1971 Lichtfang.

V.: Nördliches und mittleres Europa (RAZOWSKI 2002). In KARSHOLT u. RAZOWSKI (1996) noch nicht für das frühere Jugoslawien angegeben.

Acleris variegana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Hoherodskopf, Künanzhaus, 1 Ex. o. A. 2.IX.19[?], 1 ♀ 22.VIII.19[?], Eichelsdorf, Eichköpffel, 2 ♂♂ 20.VIII.1968, Ullrichstein, Nickel, 2 ♂♂ 1 Ex. o. A. 28.VIII.1967, Gadem, 1 ♂ 29.VIII.1968, Sichenhausen, 1 ♂ 18.VIII.1967, Eschenrod, Eichelsbachtal, 1 ♀ 21.VIII.1968; Wetterau: Friedberg, 1 Ex. o. A. 17.VII.1967 Lichtfang, 1 ♂ 21.VII.1967 Lichtfang, 1 ♂ 8.VIII.1967, 1 ♂ 25.VIII.1967 Lichtfang, 1 ♂ 1.IX.1967, Ober-Mörlen, 1 ♂ 12.VIII.1972 Lichtfang, Reichelsheim, am Lehmberg, 10.IX.1969 Licht.

V.: Europa bis Kasachstan und Südwest-Sibirien, NW-Afrika, Kleinasien, Kaukasus, Iran bis Zentralasien, Afghanistan und China (KUZNETSOV 1989, RAZOWSKI 2002).

Acleris aspersana (HÜBNER, [1814-1817])

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Eschenrod, Warte, 1 ♂ 1 Ex. o. A. 1.VIII.1968, 2 ♂♂ 1 ♀ 5.VIII.1968, Goldwiese, 3 ♂♂ (alle GU Dr. THOMAS) 1 ♀ 1 Ex. o. A. 28.VIII.1968, Sichenhausen, 1 ♂ 18.VIII.1967, Forellenteiche, 1 ♂ 22.VIII.1968, 1 ♂ 27.VIII.1968, Volkartshain, Hundsbachtal, 1 ♂ 22.VIII.1968, Ullrichstein, Nickel, 1 ♂ 28.VIII.1967; „20“ 1 ♀.

V.: Europa (außer mediterranes Gebiet), nördliches und zentrales Russland bis Kasachstan und Zentral-Sibirien (KUZNETSOV 1989, RAZOWSKI 2002).

Acleris shepherdana (STEPHENS, 1852)

Deutschland: [Vogelsberg/Hessen: Hoherodskopf], K[ünanzhaus], 1 ♂ (GU Dr. THOMAS) 12.VIII.[19?]; [Wetterau/Hessen], F[ried]b[erg], 1 ♀ (GU Dr. THOMAS) 4.VIII.[19?], 1 ♂ (GU Dr. THOMAS) 13.VIII.[19?].

V.: Von nördlichen und mittleren Europa bis zum Fernen Osten (KUZNETSOV 1989, RAZOWSKI 2002). Nach GAEDIKE u. HEINICKE (1999) noch nicht aus Hessen gemeldet.

Acleris hastiana (LINNAEUS, 1758)

Deutschland: [Wetterau/Hessen], F[ried]b[erg], 1 ♂ (GU Dr. THOMAS) 14.VIII.[19?].

V.: Holarktisch; Europa bis Japan, Nordamerika südlich bis Kalifornien (RAZOWSKI 2002).

Acleris hyemana (HAWORTH, [1811])

Deutschland: Würt[em]b[er]g, Allgäu, Fetsachmoos, 1 ♀ 14.X.[19]56, G. REICH, 1 ♂ 24.X.[19]56, G. REICH.

V.: Nördliches und mittleres Europa (RAZOWSKI 2002).

***Acleris scabrana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER), 1775)**

Rumänien: Dobrudscha: Hagieni, 1 ♂ (GU Dr. THOMAS) 1.VII.1973 a[m] L[icht], 1 ♂ 2.VII.1973 a[m] L[icht].

V.: Europa (kaum in Skandinavien und im mediterranen Bereich) über Kasachstan und Sibirien bis Fernost, Kleinasien, Nordamerika (KARSHOLT u. RAZOWSKI 1996, KUZNETSOV 1989, RAZOWSKI 2002).

***Acleris ferrugana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

Deutschland: Vogelsberg/Hessen: Gierbachtal, 1 ♀ 1.XI.1968; Obere Donau: Hausen i. T. 1 ♂ 1.-13.4.[19]74, leg. SWOBODA; Württ[em]b[er]g, Oberland, Federseemoor, 1 ♂ 1 Ex. o. A. 25.X.[19]54, G. REICH.

V.: Europa (fehlt auf dem südlichen Balkan) (KARSHOLT u. RAZOWSKI 1996, RAZOWSKI 2002). Nach GAEDIKE u. HEINICKE (1999) noch nicht aus Hessen gemeldet.

***Acleris notana* (DONOVAN, 1806)**

Deutschland: Mittelrhein: Umg. Köln, Königsforst, 1 ♂ 1 Ex. o. A. 24.III.1973, 1 ♂ (Gen.-Präp. 1777 [KARISCH]), 1 Ex. o. A. 6.IV.1974.

Italien: Südtirol: Partschins, 1 ♂ 1 Ex. o. A. 11.VII.1972, 1 ♀ (Gen.-Präp. 1774 [KARISCH]) 16.VII.1972.

Rumänien: Cibin-Geb[irge]¹⁾: Fraga, 3 ♂♂ 1 Ex. o. A. 22.VII.1971.

V.: Von Europa (fehlt auf dem südlichen Balkan) (KARSHOLT u. RAZOWSKI 1996) über Kasachstan, Sibirien, Transbaikalien (KUZNETSOV 1989) bis Japan (RAZOWSKI 2002); in Nordamerika eingeschleppt (KUZNETSOV 1989).

***Acleris kochiella* (GOEZE, 1783)**

Rumänien: Bucuresti, „Vogelwald“, 1 ♂ (GU Dr. THOMAS) 5.VIII.1971 Lichtfang; Dobrudscha: Babadag, 1 ♀ (Gen.-Präp. 1782 [KARISCH]) 4.VII.1973 a[m] L[icht].

V.: Mittleres und südliches Europa (außer südlicher Balkan) bis Ferner Osten (KARSHOLT u. RAZOWSKI 1996, RAZOWSKI 2002).

***Acleris boscanoides* RAZOWSKI, 1959**

Rumänien: Dobrudscha: Hagieni, 1 ♀ (Gen.-Präp. 1783 [KARISCH]) 1.VII.1973 a[m] L[icht], Val[u lui] Traian, 4 ♂♂ (1 ♂ Gen.-Präp. 1781 [KARISCH]) 4 ♀♀ (1 ♀ Gen.-Präp. 1784 [KARISCH]) 29.VI.1973 a[m] L[icht].

V.: Balkanhalbinsel, Ukraine, Krim, Kleinasien, Iran (KUZNETSOV 1989, RAZOWSKI 2002).

***Acleris logiana* (CLERCK, 1759)**

Deutschland: Wetterau/Hessen, Burgholzhausen, 1 ♂ 25.VIII.1968; Taunus: Haintchen, 1 ♂ 23.IX.1968; Mittelrhein: Umg. Köln, Königsforst, 1 Ex. o. A. 24.III.1973, 3 ♂♂ 1 Ex. o. A. 7.IV.1974; Württ[em]b[er]g, Allgäu, Wurzacher Ried, 25.IX.[19]52, G. REICH. **Italien:** Südtirol: Vintschgau; Partschins, 1 Ex. o. A. 11.VII.1972. **Rumänien:** Cibin-Geb[irge]: 1 ♂ (GU Dr. THOMAS) Fraga, 22.VII.1971.

V.: Europa (nicht auf dem südlichen Balkan) bis Japan; Nordamerika (KARSHOLT u. RAZOWSKI 1996, RAZOWSKI 2002).

***Acleris roscidana* (HÜBNER, [1796-1799])**

Österreich: Tirol: Ahrntal, 1 ♂ 2 ♀♀ 12.9.1941, coll. KLIMESCH.

V.: Nord- und Zentraleuropa, nördlicher Balkan (KARSHOLT u. RAZOWSKI 1996, RAZOWSKI 2002).

¹⁾ Zu diesem Fundort siehe KARISCH (2004).

***Acleris literana* (LINNAEUS, 1758)**

Deutschland: Taunus/Hessen: Langenhain, Vogeltal, 1 ♀ 10.V.1970, 1 ♀ Sept[ember] [19]70; Mittelrhein: Lorch, 1 ♀ 15.4.[19]67 Li[cht], leg. H. KINKLER; Bergisches Land: Unnenberg, 1 ♀ 23.10.[19]71, leg. H. KINKLER.

V.: Europa (RAZOWSKI 2002), Kleinasien (KENNEL 1908 nach RAZOWSKI 2002).

Dank

Für die fachliche Unterstützung bei der Arbeit danke ich den Herren Prof. Dr. J. RAZOWSKI, Institut of Systematics and Evolution of Animals, Kraków, Dr. K. R. TUCK, The Natural History Museum, London, und E. GÖRGNER, Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau. Sammlungsvergleiche in ausländischen Museen bzw. Instituten wurden durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, Berlin, ermöglicht.

Literatur

- GAEDIKE, R. u. HEINICKE, W. (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). – Entom. Nachr. u. Ber., Beih. 5: 1-216.
- KARISCH, T. (1999): Die Sammlungen des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau. VI. Die Cochylini (Lepidoptera, Tortricidae) der Sammlung Dr. W. THOMAS. – Naturw. Beiträge Museum Dessau, H. 11: 214-234.
- (2003): Die Sammlungen des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau. VII. Die Cochylini (Lepidoptera, Tortricidae) der Sammlung Dr. W. THOMAS (Nachtrag) mit Beschreibung von zwei neuen Arten – Naturw. Beiträge Museum Dessau, H. 15: 121-129.
- (2004): Die Sammlungen des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau. VIII. Die Chlidanotinae (Lepidoptera, Tortricidae) der Sammlung Dr. W. THOMAS. – Naturw. Beiträge Museum Dessau, H. 16: 67-69.
- KARSHOLT, O. u. RAZOWSKI, J. (1996): The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. – Apollo Books, Stenstrup, 380 S.
- KUZNETSOV, V. I. (1989): Family Tortricidae (Tortricid Moths). – In: MEDVEDEV, G. S. (ed.): Keys to the Insects of the European Part of the USSR. Vol. IV: Lepidoptera, Part I. – E. J. Brill, Leiden, New York, København, Köln, S. 279-956.
- RAZOWSKI, J. (2002): Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Volume 1: Tortricinae and Chlidanotinae. – Slamka, Bratislava, 247 S.

Anschrift des Verfassers:

Timm Karisch
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau
Askanische Straße 32
D-06842 Dessau